




# 京都私立病院協会嚥下食一覧表

|     |        |
|-----|--------|
| 施設名 | 京都武田病院 |
|-----|--------|

| 学会分類<br>2013(※) | 食事の名称            | 形態                                | 食事の特徴  | 写真  |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|--|---|
| 0j              | 嚥下困難食Ⅰ<br>嚥下困難食Ⅱ | ゼリー状                              | 絶食からの開始の場合や嚥下状態を見るときに適する。<br>主食と副食がそろった食事ではなく、嚥下困難食Ⅰは1日1食(昼)、Ⅱは1日2食(昼・夕)を提供する。   |    |
| 0t              | (設定なし)           |                                   |  |   |
| 1j              | ゼリー食             | ゼリー状                              | ソフトリッチ、栄養剤のゼリー、粥ゼリーなどを1日3食提供する。  |   |
| 2-1             | 流菜<br>嚥下困難食Ⅲ     | ペースト状<br>(主食はミキサー粥、粥、米軟より選択)      | 肉や魚、野菜などをミキサーにかけ、トロミ付けしたものが流菜。さらに、口腔内で切りやすいように、(付着性が低く凝集性が高い)くず粉で固めたものが、嚥下困難食Ⅲである。<br>肉や魚をトロミ付けしたものは2-2となり、野菜に関しては2-1であり、混在している。 |  |
| 2-2             |                  |                                   |  |   |
| 3               | (設定なし)           |                                   |  |   |
| 4               | 嚥下困難食Ⅳ           | みじん切り+あんかけ<br>(主食はミキサー粥、粥、米軟より選択) | みじん切りにした調理済み食材にあんかけをし、口腔内でばらけにくくしている。  |  |