

京都私立病院協会嚥下食一覧表

| | |
|-----|------|
| 施設名 | 共和病院 |
|-----|------|

| 学会分類 2013(※) | 食事の名称 | 形態 | 食事の特徴 | 写真 |
|-----------------|-----------------|---|--|---|
| 0j | 嚥下開始食 | ゼリー | タンパク質を含まない糖質メインの市販のゼリーを1日1食から提供 |  |
| 0t | (設定なし) | | | |
| 1j | 嚥下1 嚥下2(a・b) | ムース状 ミキサーにかけ スベラカーゼ1～ 1.5%で固めたもの | 嚥下1・・・全粥ゼリー、汁ゼリー、市販ゼリー3品 嚥下2・・・軟々菜食をミキサーにかけゼリーに固めたもの。お茶ゼリーを食事時に提供 主食スベラカーゼ2%、副食スベラカーゼ1～1.5% カロリーの違い(量)によりa・bと区分 |  |
| 2-1 | 嚥下3 嚥下4 | 主食 粥ゼリー 副菜 ミキサーとろみ | 嚥下3・・・主食全粥ゼリースベラカーゼ2%、副食ミキサーとろみスルーキングi1～1.5% 嚥下4・・・主食全粥ゼリースベラカーゼ0.7%、副食ミキサーとろみスルーキングi1～1.5% 状況に応じてお茶とろみも提供 |  |
| 2-2 | (設定なし) | | | |
| 3 | (設定なし) | | | |
| 4 | 嚥下5 | 主食は全粥または軟飯 副菜はきざみ(0.5mm) とろみ | 主食は全粥を基本とし軟飯も可能 副菜は刻んで(0.5mm)スルーキングi1～1.5%でとろみをつけたもの |  |